

Tabla 6.21. Análisis univariado y multivariado de las variables demográficas.

Variables	N	%	MORTALIDAD GLOBAL				RECIDIVA				MORTALIDAD POR CANCER ORAL			
			n	LR ¹	RRa ² (95% IC)	RRb ³ (95% IC)	n	LR ¹	RRa ² (95% IC)	RRb ³ (95% IC)	n	LR ¹	RRa ² (95% IC)	RRb ³ (95% IC)
EDAD														
<50	41	26	17	0,42	1.0 (ref.) ⁴	1.0 (ref.)	16	0,66	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	15	0,43	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)
50-59	39	25	23		1.48 (0.79-2.76)	1.31 (0.68-2.51)	14		0.84 (0.40-1.72)	0.86 (0.41-1.84)	16		1.29 (0.63-2.61)	1.18 (0.56-2.44)
60-69	49	32	23		1.10 (0.58-2.05)	1.23 (0.64-2.39)	14		0.62 (0.30-1.26)	0.54 (0.25-1.17)	12		0.71 (0.33-1.53)	0.87 (0.39-1.93)
>70	26	17	15		1.59 (0.79-3.20)	2.20 (1.06-4.58)	8		0.76 (0.32-1.97)	0.75 (0.31-1.80)	9		1.33 (0.58-3.06)	1.96 (0.80-4.80)
SEXO														
Hombre	135	87		0,11	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)		0,17	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)		0,06	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)
Mujer	20	13			0.51 (0.22-1.19)	0.81 (0.34-1.92)			0.49 (0.17-1.37)	0.60 (0.21-1.72)			0.33 (0.10-1.08)	0.56 (0.17-1.87)
ESCOLARIZACIÓN														
Sí	140	90	73	0,20			46	0,78			46	0,47		
No	15	10	5		0,45(0,18-1,14)	0,42(0,16-1,07)	6		1,23 (0,50-3,02)	1,22 (0,49-3,04)	6		0,59 (0,20-1,73)	0,49 (0,16-1,47)
<i>Tendencia</i>						N.S.				N.S.				
Años escolarización														
No	15	10	5	0,23	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	6	0,08	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	6	0,33	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)
1-3	23	15	16		2,78(1,01-7,66)	3,39(1,22-9,38)	11		1,25 (0,45-3,48)	1,61(0,56-4,58)	11		2,70(0,81-8,93)	4.92(1,42-17,03)
4-7	49	32	27		2,23 (0,84-5,87)	2,19 (0,82-5,86)	14		0,71 (0,26-1,90)	0,73 (0,26-1,98)	14		1,62(0,52-4,98)	2,02(0,61-6,60)
8-10	44	28	19		1,88 (0,68-5,22)	2,17 (0,77-6,13)	9		0,49 (0,16-1,46)	0,35 (0,11-1,12)	9		1,34(0,41-4,44)	1,51(0,44-5,20)
>=11	24	15	11		1,73 (0,58-5,16)	1,71 (0,57-5,11)	12		1,26 (0,44-3,66)	1,37 (0,47-3,95)	12		1,39(0,40-4,83)	1,54(0,44-5,30)
<i>Tendencia</i>						N.S.				N.S.				

- LR¹: Valor de la P del Log Rank Test
- Rra²: Riesgo Relativo ajustado por edad y sexo
- RRb³: Riesgo Relativo ajustado por edad, sexo, localización y estadio clínico
- 1.0 (ref.)⁴: categoría de referencia
- Valores en **negrita** denotan resultados estadísticamente significativos (P<0,05).

Tabla 6.22. Análisis univariado y multivariado de las variables de tabaco.

Variables	N	%	MORTALIDAD GLOBAL				RECIDIVA				MORTALIDAD POR CANCER ORAL			
			n	LR ¹	RRa ² (95% IC)	RRb ³ (95% IC)	n	LR ¹	RRa ² (95% IC)	RRb ³ (95% IC)	n	LR ¹	RRa ² (95% IC)	RRb ³ (95% IC)
TABACO														
Fumador	101	65	55	0,23	1.0 (ref.) ⁴	1.0 (ref.)	36	0,55	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	40	0,14	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)
Nunca	18	12	5		0,56(0,16-1,94)	0,43(0,09-1,97)	4		1,09(0,239-4,94)	0,33(0,08-1,44)	4		1,22(0,30-5,03)	1,24(0,14-10,92)
Ex-fumador	36	23	18		0,85(0,49-1,46)	0,84(0,46-1,53)	12		0,92(0,474-1,80)	0,77(0,37-1,64)	8		0,51(0,24-1,11)	0,51(0,21-1,25)
Nº de cigarrillos/día														
Nunca	18	12	5	0,39			4	0,08			4	0,17		
1-18	22	14	9		1,52(0,38-6,21)	2,23(0,43-11,46)	7		0,77(0,15-3,77)	2,03(0,45-9,17)	5		0,49(0,10-2,48)	0,45(0,04-4,29)
19-22	32	21	16		1,72(0,47-6,35)	2,16(0,45-10,16)	15		1,28(0,28-5,73)	3,52(0,81-15,28)	14		0,92(0,22-3,92)	0,70(0,08-5,84)
23-34	34	22	19		1,97(0,50-7,78)	2,23(0,42-11,67)	6		0,36(0,06-1,93)	1,15(0,21-6,15)	7		0,42(0,09-2,07)	0,28(0,03-2,77)
>=35	49	32	29		2,08(0,55-7,95)	2,73(0,54-13,78)	20		0,91(0,20-4,14)	2,81(0,61-12,83)	22		0,87(0,20-3,74)	0,68(0,07-6,02)
<i>Tendencia</i>							<i>N.S.</i>				<i>N.S.</i>			
Años de no fumar														
Fumadores	101	74	55	0,93	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	36	0,97	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	40	0,55	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)
1-3	13	9	6		0,69(0,30-1,64)	1,12(0,46-2,71)	4		0,80(0,28-2,31)	1,07(0,36-3,14)	3		0,47(0,15-1,54)	1,01(0,30-3,33)
4-8	8	6	4		1,08(0,38-3,04)	0,68(0,14-3,28)	3		1,12(0,33-3,71)	0,51(0,09-2,72)	2		0,61(0,14-2,55)	0,12(0,01-2,75)
9-20	15	11	8		0,83(0,35-1,98)	0,76(0,33-1,74)	5		0,94(0,32-2,76)	0,56(0,17-1,82)	3		0,44(0,10-1,84)	0,31(0,60-1,41)
<i>Tendencia</i>							<i>N.S.</i>				<i>N.S.</i>			
Si fumaba antes, ¿Fuma después del diagnóstico?														
Fumo	30	35	13	0,80	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	8	0,33	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	10	0,92	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)
No fumo	56	65	27		1,11(0,56-2,19)	0,92(0,46-1,83)	20		1,36(0,58-3,19)	1,32(0,56-3,12)	17		1,06(0,47-2,38)	0,88(0,39-1,99)

- LR¹: Valor de la P del Log Rank Test
- Rra²: Riesgo Relativo ajustado por edad y sexo
- RRb³: Riesgo Relativo ajustado por edad, sexo, localización y estadio clínico
- 1.0 (ref.)⁴: categoría de referencia
- Valores en **negrita** denotan resultados estadísticamente significativos (P<0,05).

Tabla 6.23. Análisis univariado y multivariado de las variables de alcohol.

Variables	N	%	MORTALIDAD GLOBAL				RECIDIVA				MORTALIDAD POR CANCER ORAL			
			n	LR ¹	RRa ² (95% IC)	RRb ³ (95% IC)	n	LR ¹	RRa ² (95% IC)	RRb ³ (95% IC)	n	LR ¹	RRa ² (95% IC)	RRb ³ (95% IC)
ALCOHOL														
Bebedor	110	71	56	0,14	1.0 (ref.) ⁴	1.0 (ref.)	39	0,69	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	44	0,11	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)
Nunca	8	5	1		0,21(0,03-1,75)	0,30(0,03-2,57)	2		1,24(0,22-6,79)	1,43(0,24-8,49)	1		0,38(0,04-3,67)	0,57(0,05-6,42)
Exbebedor	37	24	21		1,14(0,68-1,90)	1,20(0,70-2,06)	11		0,82(0,41-1,62)	0,79(0,38-1,63)	7		0,49(0,22-1,10)	0,45(0,18-1,11)
Gramos de alcohol día														
0	8	5	1	0,20	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	2	0,67	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	1	0,18	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)
1-23	21	14	8		4,22(0,49-36,26)	2,55(0,28-23,25)	5		0,68(0,11-3,94)	0,39(0,05-2,84)	5		1,84(0,18-18,72)	1,00(0,08-12,26)
24-72	33	21	15		5,45(0,60-48,96)	4,21(0,45-39,09)	11		0,82(0,13-5,03)	0,97(0,13-6,98)	9		2,16(0,20-23,60)	1,52(0,11-20,47)
73-150	41	26	24		8,29(0,91-75,20)	7,12(0,75-66,89)	17		0,97(0,15-5,97)	1,18(0,17-8,16)	16		3,34(0,31-36,58)	3,27(0,24-43,76)
>=151	52	34	30		7,18(0,79-65,03)	5,09(0,53-48,87)	17		0,70(0,11-4,34)	0,83(0,11-6,05)	21		3,63(0,33-39,59)	3,25(0,23-44,56)
Tendencia									N.S				P=0,055	
Años de no beber														
Bebedor	110	75	56	0,89	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	39	0,97	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	44	0,63	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)
1-2	10	7	4		0,91(0,32-2,53)	0,80(0,24-2,62)	3		1,04(0,31-3,45)	0,71(0,16-3,03)	2		0,59(0,14-2,47)	0,34(0,04-2,57)
3-7	9	6	6		1,35(0,57-3,19)	1,78(0,72-4,43)	3		0,80(0,24-2,61)	0,94(0,28-3,17)	2		0,56(0,13-2,34)	0,77(0,17-3,41)
8,13	8	5	5		1,24(0,49-3,13)	1,38(0,51-3,70)	2		0,70(0,16-2,92)	0,71(0,16-3,11)	1		0,42(0,06-3,04)	0,72(0,09-5,55)
>=14	10	7	6		1,11(0,44-2,73)	1,10(0,42-2,89)	3		0,73(0,21-2,20)	0,78(0,21-2,80)	2		0,42(0,10-1,82)	0,32(0,06-1,55)
Tendencia					N.S				N.S				P=0,06	
Si bebía antes, ¿Bebe después del diagnóstico?														
Bebo	48	34	29	0,07	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	17	0,74	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	18	0,14	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)
No bebo	49	65	20		0,60(0,34-1,08)	0,68(0,37-1,22)	14		0,70(0,34-1,43)	0,71(0,34-1,50)	14		0,59(0,29-1,20)	0,58(0,28-1,21)
Tendencia					P=0,09									

- LR¹: Valor de la P del Log Rank Test
- Rra²: Riesgo Relativo ajustado por edad y sexo
- RRb³: Riesgo Relativo ajustado por edad, sexo, localización y estadio clínico
- 1.0 (ref.)⁴: categoría de referencia
- Valores en **negrita** denotan resultados estadísticamente significativos (P<0,05).

Tabla 6.24. Análisis univariado y multivariado de las variables de dieta.

	Variables	N	%	MORTALIDAD GLOBAL			RECIDIVA			MORTALIDAD POR CANCER ORAL					
				n	LR ¹	RRa ² (95% IC)	RRb ³ (95% IC)	n	LR ¹	RRa ² (95% IC)	RRb ³ (95% IC)	n	LR ¹	RRa ² (95% IC)	RRb ³ (95% IC)
ANTES DEL DIAGNÓSTICO	INGESTA DE VEGETALES														
	<=4 ⁴	63	41	41	0,01	1.0 (ref.) ⁵	1.0 (ref.)	28	0,04	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	26	0,04	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)
	5-7	44	28	21		0,69(0,40-1,194)	0,64(0,36-1,11)	12		0,49(0,246-0,99)	0,49(0,24-0,99)	16		0,77(0,40-1,45)	0,65(0,34-1,25)
	>=8	48	31	16		0,46(0,26-0,820)	0,51(0,28-0,95)	12		0,46(0,23-0,92)	0,45(0,22-0,91)	10		0,41(0,20-0,85)	0,43(0,21-0,92)
	Tendencia					<i>P=0.021</i>				<i>P=0.01</i>				<i>P=0.02</i>	
	INGESTA DE FRUTAS														
	<=4 ⁴	52	34	28	0,27	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	22	0,24	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	20	0,96	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)
5-7	47	30	19		0.83 (0.46-1.49)	0.67 (0.36-1.22)	15		0.78 (0.40-1.53)	0.69 (0.34-1.30)	15		1.06 (0.54-2.09)	0.84 (0.42-1.70)	
>=8	56	36	31		1,25(0,74-2,09)	1,15(0,67-1,96)	15		0,59(0,30-1,15)	0,53(0,27-1,05)	17		1,01(0,53-1,94)	0,92(0,46-1,83)	
AL CABO DE UN AÑO DEL DIAGNÓSTICO	TIPO DE INGESTA DE ALIMENTOS AL CABO DE UN AÑO DEL DIAGNÓSTICO														
	Igual ⁶	51	34	11	0,00	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	18		1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	10	0,00	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)
	No	31	21	12		1,82(0,78-4,23)	1,39(0,59-3,29)	9		0,79(0,34-1,84)	0,61(0,25-1,44)	8		1,35(0,52-3,52)	0,76(0,28-2,06)
	No sabe	26	17	24		12,81(6,00-27,32)	10,21(4,64-22,44)	11		1,50(0,69-3,28)	1,34(0,58-3,09)	19		9,41(4,19-21,11)	6,84(2,91-16,10)
	Triturada	27	18	14		3,26(1,46-7,25)	2,51(1,09-5,76)	9		1,00(0,44-2,26)	0,81(0,34-1,88)	9		2,43(0,98-6,02)	1,21(0,47-3,05)
	Gastrostomía	15	10	12		6,79(2,65-17,40)	5,65(2,17-14,68)	5		0,94(0,32-2,71)	0,91(0,31-2,68)	6		3,93(1,25-12,33)	2,98(0,96-9,22)
	INGESTA DE VEGETALES				<i>Solo pacientes que comen por boca</i>										
	<=4 ⁴	26	32	14	0,01	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	12	0,09	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	10	0,01	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)
	5-7	28	34	5		0,21(0,07-0,62)	0,16(0,05-0,50)	6		0,34(0,12-0,93)	0,23(0,08-0,69)	5		0,32(0,10-0,96)	0,20(0,06-0,67)
	>=8	28	34	4		0,18(0,06-0,56)	0,17(0,05-0,54)	9		0,61(0,25-1,43)	0,59(0,24-1,43)	3		0,16(0,04-0,60)	0,13(0,02-0,53)
Tendencia					<i>P=0,00</i>				<i>N.S.</i>				<i>P=0,00</i>		
INGESTA DE FRUTAS															
<=4 ⁴	47	42	19	0,14	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	16	0,72	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	12	0,46	1.0 (ref.)	1.0 (ref.)	
5-7	28	25	5		0,45(0,16-1,26)	0,47(0,16-1,32)	7		0,78(0,31-1,96)	0,60(0,22-1,60)	4		0,68(0,21-2,21)	0,75(0,22-2,51)	
>=8	36	32	14		0,81(0,39-1,69)	0,73(0,35-1,57)	12		0,93(0,43-2,04)	0,89(0,40-1,96)	10		0,95(0,39-2,33)	0,87(0,35-2,12)	
Tendencia					<i>N.S.</i>				<i>N.S.</i>				<i>N.S.</i>		

- LR¹: Valor de la P del Log Rank Test
- Rra²: Riesgo Relativo ajustado por edad y sexo
- RRb³: Riesgo Relativo ajustado por edad, sexo, localización y estadio clínico
- 1.0 (ref.)⁴: categoría de referencia
- Valores en **negrita** denotan resultados estadísticamente significativos (P<0,05).